



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CONCURSO PÚBLICO DA ÁREA DA SAÚDE - EDITAL Nº 006/2009
FUNDAMENTAL
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 6 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Português (5 questões), Matemática (5 questões), Conhecimentos Gerais (3 questões) e Conhecimentos Específicos (37 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 3h30min (três horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1(uma) hora após seu início.
- VII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XI. O caderno de questões será disponibilizado no site www.ibfc.org.br.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

PORTUGUÊS

Para responder as questões de 1 e 2, considere o texto abaixo:

A gripe suína é comum em porcos da região centro-oeste dos Estados Unidos da América (e ocasionalmente em outros estados), no México, Canadá, América do Sul, Europa (Incluindo o Reino Unido, Suécia e Itália), Quênia, China continental, Taiwan, Japão e outras partes da Ásia oriental.

O vírus da gripe suína causa uma doença respiratória altamente contagiosa entre os suínos, sem provocar, contudo, grande mortalidade. Habitualmente não afeta humanos; no entanto, existem casos esporádicos de contágio, laboratorialmente confirmados, em determinados grupos de risco. A infecção ocorre em pessoas em contacto direto e constante com estes animais, como agricultores e outros profissionais da área. A transmissão entre pessoas e suínos pode ocorrer de forma direta ou indireta, através das secreções respiratórias, ao contactar ou inalar partículas infectadas. O quadro clínico da

infecção pelo vírus da gripe suína é em geral idêntico ao de uma gripe humana sazonal.

Os suínos podem igualmente ser infectados pelo vírus da influenza humana – o que parece ter ocorrido durante a gripe de 1918 e o surto de gripe A (H1N1) de 2009 – assim como pelo vírus da influenza aviário. A transmissão de gripe suína de porcos a humanos não é comum e carne de porco corretamente cozinhada não coloca risco de infecção. Quando transmitido, o vírus nem sempre causa gripe em humanos, e muitas vezes o único sinal de infecção é a presença de anticorpos no sangue, detectáveis apenas por testes laboratoriais.

Quando a transmissão resulta em gripe num ser humano, é designada gripe suína zoonótica. As pessoas que trabalham com porcos, sujeitas a uma exposição intensa, correm o risco de contrair gripe suína. No entanto, apenas 50 transmissões desse gênero foram registradas desde meados do século XX, quando a identificação de subtipos de gripe se tornou possível. Raramente, estas estirpes de gripe suína podem ser transmitidas entre seres humanos.

1) Considere as afirmações:

- I. A palavra “suína” é acentuada porque é proparoxítona.
- II. A palavra “vírus” é acentuada porque é uma paroxítona terminada em vogal.

Está correto o que se afirma em:

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) Nenhuma

2) Considere a oração:

Habitualmente não afeta humanos.

Se a palavra destacada fosse substituída pelo pronome correspondente, o correto seria:

- a) Habitualmente não afeta-lhe.
- b) Habitualmente não afeta-os.
- c) Habitualmente não os afeta.
- d) Habitualmente não se afeta.

Para as questões de 3 a 5, considere a notícia abaixo:

Rondônia registra mais de 22 mil casos de dengue

GABRIELA CABRAL - Agência Estado

PORTO VELHO - O aumento do número de casos de dengue em Rondônia deixa as autoridades de saúde em alerta. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, Rondônia possuiu 22.138 casos de dengue concentrados, na maior parte, em 17 municípios.

Ao todo 15 pessoas já morreram supostamente vítimas da dengue. Jarú, Cacoal, Ariquemes e Pimenta Bueno lideram as estatísticas de municípios com maior risco de contaminação. Apesar do alto número de casos, o governo descarta epidemia.

Cacoal, a cerca de 500 quilômetros de Porto Velho, foi onde houve registros de mais mortes, somando cinco vítimas. O Ministério Público, por meio da promotoria de saúde, sugeriu medidas para coibir a proliferação de casos. Entre as sugestões, está a publicação de decreto pela prefeitura instituindo multa aos proprietários de terrenos que deixam acumular água.

No Centro de Medicina Tropical de Rondônia - Cemetrion - hospital referência no atendimento a pacientes com dengue no Estado, que fica em Porto Velho, foi implantada uma enfermaria exclusiva para atender os casos, com capacidade para dez leitos. No ano passado, a unidade atendeu 322 casos, incluindo uma morte.

3) Considere as afirmações:

- I. Já se considera oficialmente uma situação epidêmica no estado de Rondônia.
- II. O texto não afirma, com certeza absoluta, que 15 pessoas morreram devido à dengue.

Está correto o que se afirma em:

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

4) Considere o trecho:

Cacoal, a cerca de 500 quilômetros de Porto Velho, foi onde houve registros de mais mortes, somando cinco vítimas.

- I. A expressão destacada está corretamente colocada entre vírgulas porque se trata de uma explicação a respeito do município.
- II. Há um erro de concordância verbal no texto, já que o correto seria "houveram".

Está correto o que se afirma em:

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) Nenhuma

5) Considere o trecho abaixo e as afirmações que se seguem:

Entre as sugestões, está a publicação de decreto pela prefeitura instituindo multa aos proprietários de terrenos que deixam acumular água.

- I. Se a palavra "proprietários" fosse substituída por "proprietárias", a preposição "aos" seria substituída por "as".
- II. Se a palavra "publicação" fosse colocada no plural, o verbo estar permaneceria inalterado.

Está correto o que se afirma em:

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) Nenhuma

MATEMÁTICA

6) Maria foi à farmácia comprar um antibiótico e descobriu que havia aumentado 15%, passando a custar t reais. Se o aumento estivesse de acordo com a inflação do período, que foi de 5%, esse antibiótico custaria:

- a) $0,9t$
- b) $1,05t$
- c) $1,10t$
- d) $\frac{21}{23}t$

7) Temos 500 mL de soro glicosado 5% e a prescrição é de 500 mL a 10%, isto significa que para a prescrição ser realizada é preciso mais:

- a) 10 g de glicose
- b) 12,5 g de glicose
- c) 25 g de glicose
- d) 50 g de glicose

8) A unidade mais utilizada para medir concentrações muito pequenas, diluídas em grande quantidade de água, é o ppm (um ppm corresponde a uma parte de soluto em um milhão de partes de solução). Num medicamento preparado com 1 g de extrato vegetal a 100 kg de água, terá uma concentração, aproximada, em ppm de:

- a) 0,01
- b) 0,1
- c) 1
- d) 10

9) Um médico prescreveu 25 mg de Nimesulida de 8 em 8 horas para uma criança. Por ser criança foi mudada a forma do medicamento, diluindo meio comprimido em 10 ml de água destilada. De acordo com as informações de embalagem tem-se que cada comprimido equivale a 100 mg, então a criança receberá a cada 12 horas, da diluição preparada com o medicamento proposto, uma dose de:

- a) 2,5 mL
- b) 5,0 mL
- c) 10,0 mL
- d) 100,0 mL

10) Um paciente faz uso de dois medicamentos. Um deles é ministrado de 12 em 12 horas e o outro de 22 em 22 horas. Se a 1ª dose dos dois medicamentos foi às 8 horas da manhã de segunda-feira, então a próxima dose dos dois medicamentos juntos será às:

- a) 20:00 hs do sábado
- b) 8:00 hs do sábado
- c) 20:00 hs da sexta-feira
- d) 8:00 hs do domingo

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Assinale a alternativa que completa a sentença: Em Campinas, no ano de 1876, inaugura-se _____, o primeiro hospital, que também abrigava meninas órfãs pela mortalidade das epidemias.

- a) o Hospital de Isolamento
- b) a Casa de Saúde de Campinas
- c) o Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência
- d) a Santa Casa de Misericórdia

12) No final do século XIX, as instituições hospitalares

- a) eram responsáveis somente pelos pacientes que vinham dos consultórios privados.
- b) assumiam a função de salvação espiritual e a segregação física daqueles que representavam risco à saúde da população em geral.
- c) esboçavam um trabalho de retaguarda de ações menos complexas, desenvolvidas nos postos de saúde, ambulatórios públicos e consultórios privados.
- d) eram responsáveis, quase que exclusivamente, pela assistência a parto e internações psiquiátricas.

13) Nos anos 30, a parcela da população pobre ou indigente era atendida

- a) em ambulatórios públicos e na Santa Casa de Misericórdia.
- b) nos Postos de Saúde.
- c) nos ambulatórios do recém implantado Instituto de Aposentadoria e Pensões (IAP).
- d) em geral por benemerência de médicos da iniciativa privada e, esporadicamente, em ambulatórios públicos, ficando a assistência hospitalar por conta do Hospital de Isolamento.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

14) Relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- | | |
|--------------------------|---|
| I- Medicamento inovador | () princípio ativo |
| II- Medicamento genérico | () medicamento patenteado |
| III- Medicamento similar | () contém os mesmos princípios ativos do medicamento de referência |
| IV- Forma farmacêutica | () composição química dos fármacos |
| V- Posologia | () apresentação do fármaco |
| VI- Fórmula farmacêutica | () estudo da quantidade de fármaco a ser administrado |

- a) VI, IV, I, V, III e II.
- b) II, I, III, IV, V e VI.
- c) II, VI, V, III, I e IV.
- d) II, I, III, VI, IV e V.

- 15) Hemácias, condrócitos, leucócitos, trombócitos, hepatócitos e néfrons são respectivamente células do:
- sangue, da cartilagem, do sangue, do sangue, do fígado e do rim.
 - sangue, da medula espinhal, do sangue, do vaso sanguíneo, do fígado e do rim.
 - osso, da cartilagem, do sangue, das plaquetas, do baço e do rim.
 - nenhuma das alternativas está correta.

16) Assinale a alternativa que contempla respectivamente os espaços em branco:

A medicação com a finalidade de aliviar sintomas é chamada de _____.

Medicamentos de uso _____ são todos os medicamentos introduzidos no organismo por via parenteral ou digestória.

Quando a profundidade de úlcera por pressão atinge o osso é denominada de _____ estágio.

A alternativa correta é:

- Curativa, interno e III.
- Sintomática, externo e IV.
- Paliativa, interno e IV.
- Curativa, interno e III.

17) Relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda e assinale a alternativa com a sequência correta:

- | | | |
|-------------------|-----|---|
| I- Amenorréia | () | mulher que está grávida pela segunda vez |
| II- Secundípara | () | mulher que já teve mais do que dois partos |
| III- Secundigesta | () | primeira menstruação de uma mulher |
| IV- Múltipara | () | ausência da menstruação |
| V- Menarca | () | período reprodutivo da mulher |
| VI - Menacme | () | mulher que passou por duas vezes no período de puerpério. |
| VII- Dismenorréia | () | síndrome durante o período menstrual |
| VIII- Leucorréia | () | corrimento vaginal |

A alternativa correta é:

- I, III, VI, VII, IV, II, V e VIII.
- III, II, V, VI, IV, VIII, I e VII.
- II, III, VI, V, VIII, I, IV e VII.
- III, IV, V, I, VI, II, VII e VIII.

18) Hemoptise, epistaxe, hematúria, hematêmese, enterorragia, estomatorragia, são sangramentos:

- da boca, nariz, através da urina, por vômito, pelo rim e de estômago.
- do pulmão, das narinas, através da urina, do estômago, do íleo ou cólon e de boca.
- do pulmão, das narinas, através da urina, do estômago, do intestino e do estômago.
- nenhumas das alternativas estão corretas.

19) Evitar aplicação de injeções intramusculares, observar e avaliar sinais de sangramento e evitar traumas são cuidados ao cliente/paciente com:

- Pênfigo vulgar.
- Leucocitose.
- Hemofilia.
- Hemostasia.

20) São denominadas doenças de veiculação hídrica aquelas doenças que a água serviu de meio de transporte de agentes patogênicos, eliminados pelo homem por meio de excretas ou de poluentes químicos e radioativos. Atinge o homem através da ingestão de água, contato da mesma com a pele /mucosas ou no preparo de alimentos. Essas doenças são:

- Cólera, poliomielite, esquistossomose e saturnismo.
- Fluorese, hepatite A, cólera, leptospirose e amebíase.
- Apenas a alternativa b está correta.
- As alternativas a e b estão corretas.

21) A hanseníase é uma doença com alto poder incapacitante, porque o bacilo acomete nervos periféricos, acarretando atrofia, paralisias e diminuição de sensibilidade dos membros superiores e inferiores. Os olhos e pálpebras também são afetados pelo bacilo. O Ministério da Saúde (Brasil, 1994) dá algumas orientações básicas para prevenção de incapacidades, exceto:

- proteger os olhos com óculos de sol e lubrificação artificial com colírio prescrito.
- massagear o membro com processo inflamatório e com ferida, deslizando a palma da mão lentamente com pressão para ativar a circulação sanguínea, repetindo de oito a dez vezes o movimento.
- A hidratação e a lubrificação da pele devem ser realizadas após mergulhar o membro na água por 10 a 15 minutos, retirar o excesso de água, enxugar entre os dedos e aplicar a substância oleosa em peles secas.
- Devido aos estigmas da doença, proporcionar acolhimento, se necessário solicitando avaliação do psicólogo e assistência social.

22) Assinale a alternativa que contempla respectivamente os espaços em branco com as terminologias adequadas do texto a seguir:

Hoje, o Sr. Antonio do leito 117, apresentou urina com presença de sangue _____, temperatura corporal de 38,5° C _____, PA=75x40cmHg _____ FR=32 _____, FC=128 _____ e glicemia capilar de 320mg/dl _____.

- Hematúria, hipotermia, hipotensão, eupnéia, normocardia e hiperglicemia.
- Hematúria, hipertermia, hipotensão arterial, taquipnéia, taquicardia e hiperglicemia.
- Hematemese, pirexia, hipertensão, hiperventilação, taquipnéia e hipoglicemia.
- Hematúria, hipertermia, hipertensão, taquicardia, taquipnéia e hiperglicemia.

23) Para a prescrição médica de Benzil-penicilina G potássica 2 800 000 UI intravenosa de 4/4 h, foi diluída um frasco ampola (FA) de 5 000 000 UI em 8 ml de água destilada. Para atender a prescrição médica aspira-se do FA _____ e nas 24 hs será administrada _____ de Benzil-penicilina G potássica. A alternativa correta que completa respectivamente o espaço em branco é:

- 4,4 ml e 26,4 ml
- 5,4 ml e 27 ml
- 5,6 ml e 33,6 ml
- 6 ml e 36 ml

24) Foi prescrito para aplicar no músculo Diclofenaco sódico 2/3 ampola. Dispondo de ampola de Diclofenaco sódico de 3 ml de 25 mg/ml, administra-se:

- 01 ml contendo 25 mg.
- 02 ml contendo 50 mg.
- 1,5 ml contendo 37,5 mg.
- nenhuma das alternativas está correta.

25) Relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- | | | |
|-------------------------|-----|--|
| I- Cirurgia diagnóstica | () | Biopsia |
| II- Cirurgia plástica | () | Alívio da dor |
| III- Cirurgia curativa | () | Remoção cirúrgica do apêndice vermiforme |
| IV- Cirurgia paliativa | () | Estética |

A sequência correta é:

- II, I, III e IV.
- I, IV, III e II.
- I, III, IV e II.
- III, II, I e IV.

26) Marque V para verdadeiro ou F para falso e assinale a alternativa correta

- () Pode colocar o uniforme privativo por cima da roupa e entrar no centro cirúrgico
() Na sala cirúrgica não precisa usar máscara
() Na área restrita do centro cirúrgico não é obrigatório o uso de máscara
() O vestiário é considerado área irrestrita
() RA é o período pós-operatório onde não é comum apresentar complicações pós-operatórias.
() O Plasma de Peróxido de hidrogênio é considerado como um agente esterilizante.
- a) F, F, F, V, V e F. c) F, F, F, V, F e V.
b) V, V, F, V, V e F. d) V, F, F, V, F e V.

27) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente os espaços em branco.

- I- _____ é a ocorrência de nº de casos de doenças infecciosas em vários locais do mundo.
II- Ocorrência de nº de casos de doenças considerada normal naquela região é denominada de _____.
III- _____ é a ocorrência de casos de doenças em proporção que ultrapassa a incidência normalmente esperada.
- a) endemia, epidemia e pandemia.
b) pandemia, endemia e epidemia.
c) epidemia, pandemia e endemia.
d) todas estão incorretas.

28) Relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- I- Oligúria () Formação de ânus artificial pela parede abdominal para drenar fezes
II- Colostomia () Grande volume de diurese /24 horas
III- Nictúria () Acorda no meio da noite para urinar
IV- Urocultura () Cultura de fezes
V- Coprocultura () Urina várias vezes pouca quantidade
VI- Polaciúria () Cultura de urina
VII- Poliúria () Diurese de 100 a 500 ml/24h
VIII- Nefrostomia () Drenagem de urina diretamente do rim, por meio de sonda inserida no rim
IX – Anúria () Diurese de até 100 ml/dia.

A alternativa correta é:

- a) I, VIII, VII, VI, V, II, IX, III e IV.
b) II, VI, III, V, VII, IV, I, VIII e IX.
c) II, VII, III, V, VI, IV, I, VIII e IX.
d) VIII, II, III, VI, V, IV, VII, I e IX.

29) Complete respectivamente as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta:

- O nome que se dá à implantação do ovo no endométrio é _____.
O período fetal inicia-se a partir da _____ª semana até o nascimento.
O líquido amniótico esverdeado indica que o feto está em _____.
O sexo da criança é determinado pelo cromossomo _____.
a) nidação, 9 (nona), em sofrimento, cromossomo Y
b) implantação, 24 (vigésima quarta), em sofrimento, cromossomo X
c) nidação, 8 (oitava), em mecônio, cromossomo Y
d) clivagem, 16 (décima sexta), sofrimento, cromossomo Y

30) Assinale a alternativa incorreta

- a) O cordão umbilical é constituído de uma veia e duas artérias umbilicais.
b) O cordão umbilical é constituído de uma artéria e duas veias umbilicais.
c) A mancha mongólica aparece mais nos RN de orientais e negros.
d) As mamas do RN podem estar aumentadas devido à ocitocina.

31) Relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- I- Eritroblastose Fetal () Acontece quando o grupo sanguíneo da mãe é O e do pai é A ou B
II- Bossa Sanguínea () Acontece porque o RN tem fígado imaturo
III- Incompatibilidade ABO () Acontece quando a mãe tem grupo sanguíneo do tipo Rh – e o pai Rh +
IV- Icterícia Fisiológica () Tumefação no couro cabeludo
- a) I, IV, III e II.
b) III, II, I, e IV.
c) III, IV, I e II.
d) Nenhuma das alternativas está correta.

32) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal é:

- a) um direito.
b) uma responsabilidade.
c) uma proibição.
d) um dever.

33) As vacinas aplicadas no bebe ao nascer ou na maternidade são:

- a) BCG, Poliomelite e Hepatite B
b) BCG, Meningite e DPT
c) BCG e Hepatite B
d) BCG e Rotavirus

34) Pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Decreto nº 94 406/87 o Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares de nível médio atribuídas à equipe de Enfermagem, exceto:

- a) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação.
b) executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de Enfermagem como de administrar medicamentos por via oral e parenteral.
c) executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes como de retirar cateter de derivação ventricular.
d) executar atividades de desinfecção e esterilização.

35) Para atender a prescrição médica de Ampicilina 1,5 g IV e Metronidazol 150 mg IV, administra-se do disponível do Frasco Ampola (FA) de 500 mg de Ampicilina e da bolsa de Metronidazol à 0,5 % de 100 ml respectivamente:

- a) 3 FA e 50 ml.
b) 1,5 FA e 150 ml.
c) 5 FA e 75 ml.
d) 3 FA e 30 ml.

36) Um dos cuidados específicos na aplicação de fenilhidantoína IV é:

- a) Uso de via exclusiva e reconstituir em solução glicosada, lavando o acesso venoso antes da aplicação.
b) Uso de via exclusiva e reconstituir em solução salina, lavando o acesso venoso antes da aplicação.
c) Uso de via venosa central exclusiva e reconstituir em água destilada ou solução glicosada, lavando o acesso venoso antes da aplicação.
d) Aplica-se em bolus em via exclusiva para efeito imediato.

- 37) **As posições: de Fowler, Ventral, Sim's, Genupeitoral, Trendelenburg, Litotomia e Supina são respectivamente:**
- lateral E, para parto vaginal, deitado de costas, de bruço, cabeça em nível mais baixo que o tronco, para exame retais e de vagina e sentado em angulo de 45°.
 - Sentado, deitado de bruço, lateral D ou E, para exames proctológico e vaginal, cabeça em relação ao tronco em nível mais baixo, para parto vaginal e deitado de costas.
 - Angulo de 45°, deitado de costas, lateral D ou E, para exame neurológico, para posicionar pacientes submetidos à safenectomia, para exame físico e para conforto.
 - nenhuma das alternativas está correta.

O texto abaixo se refere às questões 38, 39, 40, 41, 42 e 43:

À noite, deu entrada pelo serviço de urgência e emergência o cicloboy J.P. de 18 anos, vítima de atropelamento. Trazido pelo grupo de resgate terrestre, em prancha longa, com colar cervical, MSD e MIE imobilizado com talas, apresenta ferida lacero – contusas, **hematoma** e escoriações na região zigomática E, **bossa sanguínea** na parietal E e **otorragia** à E. Tórax com escoriações, assimétrico, respiração superficial rápida e irregular, pulso fino, fraco e rápido; extremidades frias e perfusão capilar diminuída. Abdome tenso, com **equimose**, Glasgow no APH = 8.

No atendimento inicial foi submetido à drenagem do hemotórax, oxigenoterapia, entubação orotraqueal, ventilação mecânica e reposição volêmica com solução de Ringer lactato e hemotransfusão.

- 38) **Em relação ao diagnóstico médico, o paciente pode estar com:**
- TCE, TRM, Fraturas, IRpA, Choque distributivo e Abdome Agudo.
 - Politraumatismo com lesão medular e múltiplas fraturas.
 - Politraumatismo com choque hipovolêmico, IRpA, TRM, TCE e Trauma toraco-abdominal.
 - Choque cardiogênico, Insuficiência respiratória e vascular.
- 39) **É incorreta a atitude da equipe de Enfermagem frente ao J.P. na sala de emergência:**
- Puncionar duas veias periféricas calibrosas para reposição volêmica com soluções cristalóide e colóide e aproveitar a punção para coleta de sangue para tipagem sanguínea.
 - Aferir sinais vitais, providenciar material de tricotomia, manter em decúbito Trendelenburg.
 - Monitorização de PA, FC, FR, Tª corporal, Saturação de O₂, administrar medicamentos prescritos, manter em decúbito dorsal horizontal.
 - Assegurar vias aéreas pérvias, aquecer o paciente, providenciar material de drenagem de tórax.
- 40) **Hematoma, bossa sanguínea, otorragia e equimose são sinais apresentados pelo J.P. e significa respectivamente:**
- Mancha arroxeadada, hematoma no couro cabeludo, sangramento pelo ouvido e pequena mancha roxa.
 - Acúmulo de sangue no tecido provocado por ruptura de vasos sanguíneos, acúmulo de sangue no couro cabeludo, sangramento pelo ouvido E e ruptura de capilares sanguíneos da pele.
 - Mancha roxa provocada por ruptura dos vasos sanguíneos, hematoma no couro cabeludo, hemorragia do ouvido E e mancha arroxeadada na pele da região abdominal.
 - As alternativas b e c estão corretas.

- 41) **As terminologias que devem ser utilizados para respiração superficial rápida e irregular, pulso fino, fraco e rápido são respectivamente:**
- taquipnéia e bradicardia.
 - taquidispnéia e taquicardia.
 - hipoventilação e taquiarritmia.
 - apenas alternativas b e c estão corretas.

- 42) **Em relação ao J.P. o diagnóstico realizado pelo enfermeiro e o plano assistencial específico é respectivamente:**
- Débito cardíaco diminuído e balanço hídrico.
 - Risco para prejuízo de integridade da pele e manter em decúbito 30°.
 - Integridade da pele prejudicada e estimular deambulação precoce e comunicação verbal.
 - As alternativas a e c estão corretas.

- 43) **É contraindicado em relação ao dreno de tórax instalado no J.P.**
- Manter o frasco em nível abaixo do tórax.
 - Registrar o aspecto, quantidade do líquido drenado.
 - Movimentar o paciente em bloco, não tracionando o dreno.
 - Pinçar o dreno para encaminhar o paciente ao centro cirúrgico.

- 44) **Pode-se afirmar que:**
- todos os artigos hospitalares têm que ser esterilizados.
 - antissépticos são substâncias químicas utilizadas em áreas hospitalares.
 - desinfetantes são substâncias químicas utilizadas para assepsia médica e cirúrgica, inclusive na pele e mucosas.
 - A NR-32 recomenda para cada situação de risco presente no ambiente de trabalho (biológico, químico, físico e ergonômico) a adoção de medidas preventivas e a capacitação dos profissionais para o trabalho seguro.

- 45) **Para administrar 1500 UI de Heparina sódica por via SC, tendo ampolas na concentração de 5000UI/0,25 ml aplica-se:**
- 0,7 ml.
 - 0,3 ml.
 - 0,075 ml.
 - Nenhuma das alternativas está correta.

- 46) **Para a prescrição médica de**
- | | | | |
|-----------------------|--------|---|---------|
| S G 5% | 500 ml | } | IV 8/8h |
| KCl 19,1% | 7 ml | | |
| NaCl 10% | 15 ml | | |
| MgSO ₄ 10% | 5 ml | | |
| GH 50% | 40 ml | | |

O nº de gotejamento a ser calculado é:

- 3 gotas/m.
 - 21 gotas/m.
 - 24 gotas/m.
 - 28 gotas/m.
- 47) **Empiema pleural, derrame pleural, pneumotórax e hemotórax são respectivamente:**
- presença de água, pus, ar e sangue na cavidade pleural.
 - presença de sangue, água, ar e sangue no pulmão.
 - presença de líquido, pus, ar e sangue na cavidade pleural.
 - presença de pus, líquido, ar e sangue na cavidade pleural.

48) Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta:

- I- Os termos deiscência, exsudato amarelado, hiperemia peri-incisional referem-se a feridas operatórias
 - II- Angiografia cerebral, ECG, EEG são exames realizado respectivamente no encéfalo, vasos sanguíneos e encéfalo
 - III- A radioterapia, braquiterapia e quimioterapia são tratamentos indicados para paciente com patologias oncológicas
- a) Todas estão corretas.
 - b) I e III estão corretas.
 - c) II e III estão corretas.
 - d) Nenhuma das alternativas está correta.


49) Relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda e assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta:

- I- HAS e DM () Hemiparesia à E, crise hipertensiva , disartria
- II- AVEI e HAS () Dieta hipossódica , controle de glicemia capilar , cefaléia
- III- BCP e Hepatite C () Disúria, hipertermia, tremores
- IV- ITU e bacteremia () Tosse produtiva, necrose hepática, colúria

A alternativa correta é:

- a) II, I, III e IV.
- b) II, I, IV e III.
- c) I, II, IV e III.
- d) IV, I, III e II.

50) Observe a figura e assinale a alternativa correta com os nomes das regiões abdominais de acordo com ordem numérica crescente.



- a) Hipocôndrio, epigástrico, hipocôndrio, flanco, umbilical, lateral, inguinal, hipogástrico e inguinal.
- b) Hipocôndrio, epigástrico, hipocôndrio, lombar, umbilical, lateral, inguinal, púbica e inguinal.
- c) Hipocôndrio, epigástrico, hipocôndrio, lombar, mesogástrico, lombar, íliaca, púbica e íliaca.
- d) As alternativas a e b estão corretas.

Realização:



Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
www.ibfc.org.br